

PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO CON EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE (FATTORI DI CRESCITA PIASTRINICI)

Gentile Signora/e, La informiamo che per eseguire l'esame indicato è importante attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

PREPARAZIONE

- Evitare l'uso di antinfiammatori e/o aspirina nei 5 giorni precedenti il prelievo, in quanto l'efficacia del trattamento potrebbe risultare compromessa;
- è permessa solo l'assunzione di acqua nelle ore precedenti al prelievo;
- essere a digiuno da almeno 4 ore;
- si consiglia una dieta leggera nei giorni che precedono il trattamento.

CONTROINDICAZIONI

Controindicazioni al trattamento possono essere considerate:

- febbre;
- stato settico;
- assunzione di farmaci antinfiammatori FANS negli ultimi 7 giorni;
- piastrinopenia ($plt < 140.000/\mu L$) o piastrinopatia;
- coagulopatia ($INR > 1.2$ e/o $aPTT \text{ ratio} > 40$ o < 25 , Fibrinogeno $< 100 \text{ mg/dl}$);
- lesioni cutanee infette o potenzialmente tali in sede di prelievo o iniezione;
- accessi venosi inadeguati.

RACCOMANDAZIONI

- Dopo ogni iniezione applicare ghiaccio sulla zona trattata per 20 minuti ogni 3- 4 ore circa;
- Non praticare sport o altre attività fisiche intense nelle 48 ore successive all'applicazione.

Per accedere alla prestazione è necessario fissare un appuntamento con la segreteria al numero di seguito riportato: 0432.585420, oppure mandando una mail di richiesta all'indirizzo: info@coram.it